こどもの予防接種　スケジュール

標準的な接種期間　　接種可能な年齢　　接種については、かかりつけの医師とよくご相談ください。　　令和7年4月現在

ワクチン			ご案内時期	0歳 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 / 1歳 12か月 13か月 14か月 15か月 16か月 17か月 18か月 19か月 20か月 21か月 22か月 23か月 / 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳 19歳 ～28歳
ロタウイルス感染症	ロタリックス（1価） ロタテック（5価）	生	〒	①② 27日以上の間隔で2回 （24週まで） ①②③ 27日以上の間隔3回 （32週まで） ①は6週から14週6日までの間を標準的な接種期間として接種することが望ましいとされています。
B型肝炎		不活化	出生翌月末	①② 27日以上の間隔で２回 ③ ①から139日（5か月）あける
小児肺炎球菌		不活化	出生翌月末	【初回①②③】 27日以上の間隔で3回（１歳まで） 【追加④】 ③から60日以上おいて1歳-1歳3か月で1回 初回①が7-11か月の場合・接種3回 初回①が1－2歳未満の場合・接種2回 初回①が1－5歳未満の場合・接種1回
5種混合 ジフテリア 破傷風・百日咳 ポリオ・ヒブ		不活化	出生翌月末	【初回①②③】 2か月から7か月までに開始、20日以上の間隔で3回 【追加④】 ③から6か月から18か月までの間隔をあける
BCG		生	出生翌月末	① 5－8か月未満で1回
麻しん風しん		生	1歳の前月 就学前年の4月	【第1期】 【第１期①】 1-2歳未満で1回 【第2期】 ① 【第２期①】 年長 就学前1年間で１回
水痘		生	1歳の前月	① 12-15か月の間に1回 ② ①から6か月以上（少なくとも３か月）あけて1回
二種混合 ジフテリア 破傷風		不活化	小6の4月	【第2期】 ① 【第2期①】 11－13歳未満で１回
日本脳炎		不活化	3歳の前月 9歳の翌月 対象者にはR7.1案内済	【第1期】 【初回①②】 6-28日の間隔で2回 【追加③】 ②からおおむね1年（6か月以上）あける 【第２期④】 ③からおおむね5年後 【特例対象者】 4回受けていない場合、不足分を20歳未満まで公費で接種が可能（平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれ）
HPV（子宮頸がん） 2価、4価、9価		不活化	中学1年の4月	平成9年4月2日～平成21年4月1日生まれまでの女性は キャッチアップ接種として令8年3月31日まで定期接種で接種可能 ※ただし、令和4～6年度中に1回以上接種した人に限る 【定期接種】12歳から高校1年生相当の年度末（3月31日）まで 【標準的接種時期】中学1年生の女子（いずれかのワクチンを接種） ・2価、4価ワクチンの場合：3回接種 ・9価ワクチンの場合：初回接種時15歳未満は2回接種、15歳以上は3回接種 【定期】 ①②③ 【キャッチアップ】

●問い合わせ先　燕市健康づくり課　健康推進係　燕市役所1階　13・14番窓口　　TEL　0256-77-8182